

Bestämningsnyckel till arter i släktet *Criorhina*

- 1. Ryggskölden och dess behåring svart. Hanens baklår uppsvällda och böjda..... *Criorhina ranunculi*
humlelik pälsblomfluga
- Ryggskölden och dess behåring åtminstone framtill brun- eller blekgul. Hanens baklår normalt utformade 2



Key to species of the genus *Criorhina*

- 1. Thoracic dorsum (incl. hairs) black. Male hind femora arched and swollen..... *Criorhina ranunculi*
- Thoracic dorsum (incl. hairs) brownish-yellow or pale yellow, at least anteriorly. Male hind femora normally shaped 2




ARTDATABANKEN

Denna nyckel är publicerad digitalt i [Artfakta](#) och togs fram år 2009 för bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Nyckelns urval av arter avspeglar systematik och svensk förekomst vid denna tidpunkt. Gruppen kan idag omfatta fler eller färre svenska arter och arternas namn kan också ha ändrats.

Så här använder du nyckeln: Gå vidare till nästa nyckelsteg genom att klicka på siffran. Genom att klicka på ett namn kommer du till en sida i Artfakta där arten/gruppen presenteras.

Källa: Bartsch, H., Binkiewicz, E., Klintbjer, A., Rådén, A. & Nasibov, E. (2009). *Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae.* (DH 53b). Uppsala: ArtDatabanken, SLU.

2. Tergit 2–4 med i mitten mer eller mindre avbrutna tvärband av grå pudring som sticker av mot den glänsande svarta grundfärgen. Banden på tergit 3 och 4 kan dock (speciellt hos hanen) vara otydliga *Criorhina asilica*
hallonblomfluga
- Tergit 2–4 helt utan tvärband 3



2. Tergites 2–4 with cross-bands of yellowish-grey dusting that stand out against the shining black basic colour. The bands are to a varying extent interrupted in the middle, and may sometimes be indistinct (especially in male tergites 3 and 4) *Criorhina asilica*
- Tergites 2–4 entirely lacking cross-bands 3

3. Tergit 2 utan kraftiga hårtofsar vid framhörnerna. Tergit 3 och 4 utan pudring. Skenben alltid med mörka hår..... *Criorhina berberina*
törneblomfluga

– Tergit 2 med kraftiga hårtofsar vid framhörnerna. Tergit 3 och 4 med kraftig gulbrun pudring. Skenben normalt med över vägande ljusa hår..... *Criorhina floccosa*
ullhårig pälsblomfluga



3. Front corners of tergite 2 without hair-tufts. No dusting on tergites 3 and 4. Tibiae with dark hairs..... *Criorhina berberina*
– Front corners of tergite 2 with large hair-tufts. Tergites 3 and 4 with heavy, yellowish-brown dusting. Hairs on tibiae usually predominately pale..... *Criorhina floccosa*